




donna incinta




donna incinta

## donna incinta

Una donna rimane incinta in media per 38 settimane e poi nasce il bambino. Durante questo periodo, molte cose cambiano nella donna. Soprattutto all'inizio della gravidanza, molte donne soffrono di nausea, aumentano di peso e, verso la fine della gravidanza, sono meno capaci di fare i compiti.




feto nell'utero




feto nell'utero

## feto nell'utero

Nelle prime otto settimane, il bambino in via di sviluppo viene chiamato embrione, dopodiché viene chiamato feto. Nelle ultime settimane prima del parto, il nascituro riprende peso. Le ossa del cranio non sono ancora cresciute insieme, permettendo al feto di adattarsi meglio al canale del parto. Solo nel corso dei primi due anni crescono insieme completamente.




vescica e uretra




vescica e uretra

## vescica e uretra

L'utero si trova sopra la vescica urinaria. Il feto preme così sulla vescica e la donna incinta deve andare più spesso in bagno.




vagina




vagina

vagina

Durante la gravidanza, tutta la zona intima viene rifornita di sangue, compresa la vagina. Durante il parto, la vagina forma il canale del parto e si espande.




utero




utero

utero

L'utero sembra una pera capovolta. Diventa sempre più grande man mano che la gravidanza avanza. Poco prima della nascita, arriva sotto l'arco costale.




placenta




placenta

## placenta

La placenta si sviluppa solo quando una donna è incinta. È attaccata alla parete dell'utero. La placenta viene espulsa dopo la nascita del bambino. Al termine della gravidanza, la placenta pesa circa 500 - 600 grammi e ha un diametro di 15 - 20 cm.




sacco amniotico con  
liquido amniotico




sacco amniotico con  
liquido amniotico

## sacco amniotico con liquido amniotico

Il sacco amniotico è pieno di liquido amniotico. Il bambino in crescita può nuotare liberamente nel sacco amniotico. Tuttavia, è ancora legato alla madre dal cordone ombelicale. Questo permette al piccolo essere di costruire i suoi muscoli e il suo scheletro in modo uniforme. Il nascituro è inoltre protetto dagli urti.



cordone ombelicale



cordone ombelicale

## cordone ombelicale

Alla nascita, il cordone ombelicale è lungo circa 50-60 cm e ha un diametro di 1,5-2 cm. Il cordone ombelicale fornisce al nascituro ossigeno e tutti i nutrienti vitali. Trasporta inoltre i prodotti di scarto, come l'anidride carbonica, alla placenta.



feto



feto

feto

Nella 33a-34a settimana di gravidanza, il nascituro dovrebbe girarsi in modo da sdraiarsi a testa in giù. Il bambino può nascere più facilmente a testa in giù. Se il bambino non si è girato al momento della nascita, si cercherà di farlo girare o si prenderà in considerazione un parto cesareo.



neonato



neonato

## neonato

Un bambino dopo la nascita è chiamato neonato. Un neonato pesa circa 3 chili. Le femmine sono spesso un po' più leggere dei maschi. Ora il bambino non è più alimentato dal cordone ombelicale. Il cordone ombelicale viene tagliato. I polmoni del bambino si sviluppano e deve respirare da solo. È meglio nutrirlo con il latte materno. Il primo latte materno prodotto si chiama colostro ed è importante per il sistema immunitario del bambino.



bambino un po' più grande



bambino un po' più grande

bambino un po' più grande

Nelle prime settimane il neonato si riprende dal faticoso parto. Ora sperimenta il mondo in cui è nato con tutti i suoi sensi. A distanza ravvicinata (circa 30 cm), il bambino vede in modo relativamente nitido. Ma la vista in lontananza è ancora sfocata. Ogni due o tre ore, il bambino chiede cibo.

## Quellen

### Texte

[Schwangerschaft – Wikipedia](#)

[Beckenendlage \(hebammenzentrum.at\)](#)

[Gebärmutter – Babys Höhle während der Schwangerschaft | Medela](#)

[Plazenta – Wikipedia](#)

[Fruchtwasser: Aufgaben und Hintergrundwissen - NetDoktor.ch](#)

[Die Nabelschnur | LILLYDOO Magazin](#)

[Entwicklungsstadien des Fötus - Gesundheitsprobleme von Frauen - MSD Manual Ausgabe für Patienten \(msdmanuals.com\)](#)

[Neugeborenes – Wikipedia](#)

[Ihr Baby in der ersten Lebenswoche | Neugeborene | swissmom](#)

### Bilder

[A Pregnant Woman in Long Dress Standing on Green Grass Field · Free Stock Photo \(pexels.com\)](#)

[BruceBlaus](#). When using this image in external sources it can be cited as: Blausen.com staff (2014).

"[Medical gallery of Blausen Medical 2014](#)". WikiJournal of Medicine 1

(2). DOI:[10.15347/wjm/2014.010](#). ISSN [2002-4436](#)., [Blausen 0747 Pregnancy](#), Bild gedreht, Beschriftung entfernt, schwarz/weiß eingefärbt, einzelne anatomische Teile farbig draufgelegt, [CC BY 3.0](#)

Ernest F, [HumanNewborn](#), Hintergrund teilweise entfernt, [CC BY-SA 3.0](#)

[Foto zum Thema baby in blauen unterteilen, die auf weißer oberfläche liegen – Kostenloses Bild zu Grau auf Unsplash](#)