





schwängere Frau




schwängere Frau

schwängere Frau

Eine Frau ist durchschnittlich 38 Wochen schwanger und dann kommt das Kind auf die Welt. Während dieser Zeit verändert sich vieles bei der Frau. Vor allem zu Beginn der Schwangerschaft leiden viele Frauen an Übelkeit, sie nehmen an Gewicht zu und gegen Ende der Schwangerschaft sind sie weniger leistungsfähig.




Fötus in der
Gebärmutter




Fötus in der
Gebärmutter

Fötus in der Gebärmutter

In den ersten acht Wochen wird das heranreifende Kind Embryo genannt, danach bezeichnet man es als Fötus. In den letzten Wochen vor der Geburt nimmt das Ungeborene nochmals kräftig an Gewicht zu. Die Schädelknochen sind noch nicht zusammengewachsen, so dass der Fötus besser durch den Geburtskanal passt. Erst im Verlaufe der ersten beiden Jahre wachsen diese vollständig zusammen.




Harnblase und
Harnröhre




Harnblase und
Harnröhre

Harnblase und Harnröhre

Die Gebärmutter liegt über der Harnblase. Der Fötus drückt somit auf die Harnblase und die Schwangere muss deshalb öfters zur Toilette gehen.




Scheide (Vagina)




Scheide (Vagina)

Scheide (Vagina)

Während der Schwangerschaft wird der ganze Intimbereich besser durchblutet, auch die Scheide. Bei der Geburt bildet die Scheide den Geburtskanal und dehnt sich aus.




Gebärmutter




Gebärmutter

Gebärmutter

Die Gebärmutter sieht wie eine auf dem Kopf stehende Birne aus. Im Verlaufe der Schwangerschaft wird sie immer grösser. Kurz vor der Geburt reicht sie bis unter den Rippenbogen.




Mutterkuchen
(Plazenta)




Mutterkuchen
(Plazenta)

Mutterkuchen (Plazenta)

Die Plazenta entsteht erst, wenn eine Frau schwanger ist. Sie befindet sich an der Gebärmutterwand. Die Plazenta wird nach der Geburt des Kindes ausgestoßen. Am Ende der Schwangerschaft ist die Plazenta ungefähr 500 – 600 Gramm schwer und hat einen Durchmesser von 15 - 20 cm.




Fruchtblase mit
Fruchtwasser




Fruchtblase mit
Fruchtwasser

Fruchtblase mit Fruchtwasser

Die Fruchtblase ist mit Fruchtwasser gefüllt. In der Fruchtblase kann das heranwachsende Kind frei herumswimmen. Es ist aber noch mit der Nabelschnur mit der Mutter verbunden. So kann das kleine Wesen seine Muskeln und das Skelett gleichmäßig aufbauen. Das Ungeborene wird auch vor Stößen geschützt.



Nabelschnur



Nabelschnur

Nabelschnur

Bei der Geburt ist die Nabelschnur ungefähr 50 – 60 cm lang und hat einen Durchmesser von 1.5 - 2 cm. Die Nabelschnur versorgt das Ungeborene mit Sauerstoff und allen lebensnotwendigen Nährstoffen. Zudem transportiert sie Abfallprodukte wie Kohlendioxid zur Plazenta.



Fötus



Fötus

Fötus

In der 33. – 34. Schwangerschaftswoche sollte sich ein Ungeborenes drehen, so dass es mit dem Kopf nach unten zu liegen kommt. Mit dem Kopf voran kann das Baby einfacher geboren werden. Hat sich das Baby bis zur Geburt nicht gedreht, wird man versuchen, das Heranwachsende noch zu drehen oder man zieht einen Kaiserschnitt in Betracht.



Neugeborenes



Neugeborenes

Neugeborenes

Ein Baby nach der Geburt bezeichnet man als Neugeborenes. Ein Neugeborenes wiegt um die 3 Kilo. Mädchen sind oft ein bisschen leichter als Jungs. Nun wird das Kind nicht mehr durch die Nabelschnur versorgt. Diese wird durchtrennt. Das Baby entfaltet die Lungen und muss selber atmen. Ernährt wird es am besten mit Muttermilch. Die erste Muttermilch, die produziert wird, heißt Kolostrum und ist wichtig für die Immunabwehr des Kindes.



etwas älteres Baby



etwas älteres Baby

etwas älteres Baby

In den ersten Wochen erholt sich das Neugeborene von der anstrengenden Geburt. Es erlebt nun die Welt in die es hineingeboren wurde, mit all seinen Sinnen. Im Nahbereich (ungefähr 30 cm) sieht das Kind relativ scharf. Doch die Fernsicht ist noch verschwommen. Alle zwei bis drei Stunden verlangt das Baby nach Nahrung.

Quellen

Texte

[Schwangerschaft – Wikipedia](#)

[Beckenendlage \(hebammenzentrum.at\)](#)

[Gebärmutter – Babys Höhle während der Schwangerschaft | Medela](#)

[Plazenta – Wikipedia](#)

[Fruchtwasser: Aufgaben und Hintergrundwissen - NetDoktor.ch](#)

[Die Nabelschnur | LILLYDOO Magazin](#)

[Entwicklungsstadien des Fötus - Gesundheitsprobleme von Frauen - MSD Manual Ausgabe für Patienten \(msdmanuals.com\)](#)

[Neugeborenes – Wikipedia](#)

[Ihr Baby in der ersten Lebenswoche | Neugeborene | swissmom](#)

Bilder

[A Pregnant Woman in Long Dress Standing on Green Grass Field · Free Stock Photo \(pexels.com\)](#)

[BruceBlaus](#). When using this image in external sources it can be cited as: Blausen.com staff (2014). "[Medical gallery of Blausen Medical 2014](#)". WikiJournal of Medicine 1

(2). DOI:[10.15347/wjm/2014.010](#). ISSN [2002-4436](#)., [Blausen 0747 Pregnancy](#), Bild gedreht, Beschriftung entfernt, schwarz/weiß eingefärbt, einzelne anatomische Teile farbig draufgelegt, [CC BY 3.0](#)

Ernest F, [HumanNewborn](#), Hintergrund teilweise entfernt, [CC BY-SA 3.0](#)

[Foto zum Thema baby in blauen unterteilen, die auf weißer oberfläche liegen – Kostenloses Bild zu Grau auf Unsplash](#)